

Име на защитената зона: Галата

Код по Натура: BG0002060



Описание на района на проучване

33 Галата се намира в Североизточна България, южно от град Варна. Територията му е между бреговата ивица на Черно море (от южната част на Варненския залив — квартал Аспарухово, едноименния нос и квартал Галата, до Змийски нос и къмпинг Рай) на изток и главен път Е87 (Варна-Бургас) в участъка село Близнаци – село Приселци – разклон квартал Аспарухово от запад. На север мястото граничи с пътя за квартал Аспарухово и вилна зона.

Основно местообитание в района на Галата са широколистните гори, които заемат половината от общата площ. Другата половина е заета от крайбрежни морски води, обработваеми площи, тревни пространства на места с храсти и ниски дървета. Около селищата има овощни градини и лозя.

Посетени са 31 квадрата 1x1 км. за 6 дена през месец май. Направени са 1649 наблюдения във времето от 06:00 до 12:20 ч.

Резултати от проучването на орнитофауната

Наблюдавани са общо 62 вида, от които 10 вида обект на защита в защитената зона.

Видими разлики в числеността от данните през 2007г. има при черночелата сврачка *Lanius minor* – сега са отчетени поне 13 двойки, а през 2007, е отбелязана само като присъствие, без конкретизирана численост.

Не е отчетена горската чучулига *Lullula arborea* – с оценена популация 20-60 дв. през 2007г.

Отчетен е обикновения пчелояд *Merops apiaster* с 135 индивида и колония от 50 двойки, като същия не е посочен във видовете през 2007г.

Таблица 24. Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и данни за видовете предмет на опазване към 2007 г.

Вид	Численост на гнездовата популация (дв.) Оценка 2007	Данни от пробни площадки – проучване 2012 (дв)	Бележки
Черен щъркел <i>Ciconia nigra</i>	1	-	
Осояд <i>Pernis apivorus</i>	1	-	
Черна каня <i>Milvus migrans</i>	-		
Орел змияр <i>Circaetus gallicus</i>	-		
Тръстиков блатар <i>Circus aeruginosus</i>	-	1	Да се добави като гнездящ за защитената зона

Вид	Численост на гнездовата популация (дв.) Оценка 2007	Данни от пробни площадки – проучване 2012 (дв)	Бележки
Малък ястреб <i>Accipiter nisus</i>	2	1	
Обикновен мишелов <i>Buteo buteo</i>	2	2	
Черношипа ветрушка <i>Falco tinnunculus</i>	3-6	1	
Орко <i>Falco subbuteo</i>	1	1	
Бухал <i>Bubo bubo</i>	1	-	
Козодой <i>Caprimulgus europaeus</i>	5-10	-	
Земеродно рибарче <i>Alcedo atthis</i>	5	-	
Синявица <i>Coracias garrulus</i>	1	1	
Сив кълвач <i>Picus canus</i>	5-20	3	Местообитанията на вида не са специално проучвани
Черен кълвач <i>Dryocopus martius</i>	5	-	Местообитанията на вида не са специално проучвани
Среден пъстър кълвач <i>Dendrocopos medius</i>	50-100	-	Местообитанията на вида не са специално проучвани
Горска чучулига <i>Lullula arborea</i>	20-60	-	
Полска бърбица <i>Anthus campestris</i>	1	-	
Черногърбо каменарче <i>Oenanthe pleschanka</i>	5	-	
Голям маслинов присмехулник <i>Hippolais olivetorum</i>	1	-	
Ястребогушо коприварче <i>Sylvia nisoria</i>	1-9	4	
Полубеловрата мухоловка <i>Ficedula semitorquata</i>	40	-	Местообитанията на вида не са специално проучвани
Червеногърба сврачка <i>Lanius collurio</i>	40-100	75	
Черночела сврачка <i>Lanius minor</i>	+	13	Да се добави като гнездящ за защитената зона
Градинска овесарка <i>Emberiza hortulana</i>	30	20	

Бележки върху състоянието на местообитанията

Няма практическа загуба на местообитания. Няма нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, включително и на естествения за тези местообитания видов състав.

Установени заплахи

В районите заети от пясъчни ивици и крайморски гори достъпни за туристите факторът безпокойство действа само по време на туристическия сезон и не води до изоставяне на подходящото местообитание.

Снимков материал



Снимка 29 Колония на пчелояди в ЗЗ „Галата“ – с. Близнаци